

Научно-исследовательская работа СНИОЭП СПИД  
«Эпидемиологический надзор за инфекцией, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и связанными с ней заболеваниями, и оценка эффективности противоэпидемических и лечебных мероприятий, направленных на предотвращение распространения ВИЧ в РФ», 2016-2020 гг.

В рамках данного НИР в настоящее время ведется три клинических исследования:

**1. «Исследование эффективности и безопасности схемы антиретровирусной терапии (АРТ), включающей отечественные препараты (ФАЗТ + ЗТС + ESV), у больных ВИЧ-инфекцией, ранее не получавших антиретровирусных препаратов»**

**Цель исследования:** Оценка эффективности и безопасности схемы АРТ, включающей отечественные препараты (фосфазид, ламивудин, элсульфаверин), у больных ВИЧ-инфекцией, ранее не получавших антиретровирусной терапии.

**Количество пациентов:** 100 больных ВИЧ-инфекцией, ранее не получавших АРТ.

**Длительность исследования:** 48 недель.

**2. «Исследование эффективности и безопасности переключения больных ВИЧ-инфекцией с текущей эффективной схемы антиретровирусной терапии (содержащей ННИОТ или ИП/г), на схему, включающую отечественные препараты (ФАЗТ + ЗТС + ESV) или на схему двойной терапии (DTG + ЗТС)»**

**Цель исследования:** Оценка эффективности и безопасности переключения больных ВИЧ-инфекцией с текущей эффективной антиретровирусной терапии (содержащей ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (ННИОТ) или ингибитор протеазы (ИП/г)), на схему, включающую отечественные препараты (ФАЗТ + ЗТС + ESV) или схему двойной терапии (долутегравир и ламивудин).

**Количество пациентов:** 260 больных ВИЧ-инфекцией, получающих АРТ.

**Длительность исследования:** 48 недель.

**3. «Апробация методики проведения доконтактной профилактики в качестве дополнительного метода профилактики ВИЧ-инфекции»**

Протокол исследования в процессе разработки.